

ARTENLISTE VÖGEL NATUROASE „BIOTOP AM STAUSEE“

Gemeinde: Birsfelden

Parzelle 1550

Bedeutend für zahlreiche Durchzügler. Viele Büsche, Sträucher mit Beeren, Teich mit Schilf, artenreiche Blumenwiese und Kleinstrukturen mit Insekten.



Distelfink (*Carduelis carduelis*)

© J.Roth

Basierend auf Angaben von: Guido Müller, Birsfelden (Präsident des NVVBs von 1983 – 1990); Dr. Georges Preiswerk, Basel (Mitglied der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission von 1999 bis 2004/ Mitglied der ornithologischen Gesellschaft Basel); Örne Akeret (Biologe und seit 2004 Präsident des NVVB); Meldung weiterer NVVB-Mitgliedern: Fritz Raschdorf, Anton Lenz, Fredi Niffeler und Fritz Liechti. Wie auch spontan Meldungen von anderen Ornithologen aus der Region Basel

Wir danken allen diesen Naturfreunden und Ornithologen für ihre unermüdlichen Meldungen recht herzlich.

Einen speziellen Dank an Dr. Georges Preiswerk für die jährliche Excel-Listen seit 1986 und seit 2003 für die fast wöchentlichen Meldungen per E-Mail!

Regelmässig beobachtete Vogelarten

| Deutscher Name | Wissenschaftl. Name | Deutscher Name | Wissenschaftl. Name |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Amsel | <i>Turdus merula*</i> | Kornweihe | <i>Cirrus cyaneus</i> |
| Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> | Kuckuck | <i>Cuculus canorus</i> |
| Baumpieper | <i>Anthus trivialis</i> | Mandarinente | <i>Aix galericulata</i> |
| Bergfink | <i>Fringilla montifringilla</i> | Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> |
| Berglaubsänger | <i>Phylloscopus bonelli</i> | Mittelmeermöwe | <i>Larus michahellis</i> |
| Bergpieper | <i>Anthus spinoletta</i> | Misteldrossel | <i>Turdus viscivorus*</i> |
| Bergstelze | <i>Motacilla cinerea</i> | Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla*</i> |
| Birkenzeisig | <i>Acanthis flammea</i> | Neuntöter | <i>Lanius collurio</i> |
| Blaumeise | <i>Parus caeruleus*</i> | Pfeifente | <i>Anas penelope</i> |
| Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> | Pirol | <i>Oriolus oriolus</i> |
| Buntspecht | <i>Dendrocopos maj</i> | Rabenkrähe | <i>Corvus corone</i> |
| Distelfink | <i>Carduelis carduelis</i> | Rauchschwalbe | <i>Hirundo rustica</i> |
| Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> | Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> |
| Elster | <i>Pica pica</i> | Rotdrossel | <i>Turdus iliacus</i> |
| Erlenzeisig | <i>Carduelis spinus</i> | Rotkehlchen | <i>Erythacus rubecula</i> |
| Fasan | <i>Phasianus colchicus</i> | Rotmilan | <i>Milvus milvus</i> |
| Feldsperling | <i>Passer montanus*</i> | Saatkrähe | <i>Corvus frugilegus</i> |
| Fichtenkreuzschnabel | <i>Laxia curvirostra</i> | Seidenreiher | <i>Egretta garzetta</i> |
| Gartenbaumläufer | <i>Certhia brachydactyla</i> | Schwanzmeise | <i>Aegithalos caudatus</i> |
| Gimpel | <i>Phrrhua phyrhula</i> | Schwarzmilan | <i>Milvus migrans</i> |
| Girlitz | <i>Serinus serinus</i> | Schwarzstorch | <i>Ciconia nigra</i> |
| Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> | Singdrossel | <i>Turdus philomelos</i> |
| Graureiher | <i>Ardea cinerea</i> | Sommeregoldhähnchen | <i>Regulus ignicapillus</i> |
| Grauschnäpper | <i>Muscicapa striata</i> | Sperber | <i>Accipiter nisus</i> |
| Grünfink | <i>Carduelis chloris</i> | Star | <i>Sturnus vulgaris</i> |
| Grünspecht | <i>Picus viridis*</i> | Steinschmätzer | <i>Oenanthe oenanthe</i> |
| Habicht | <i>Accipiter gentilis</i> | Stockente | <i>Anas platyrhynchos*</i> |
| Haubenmeise | <i>Parus cristatus</i> | Strassentaube | <i>Columba domestica</i> |
| Hausperling | <i>Passer domesticus</i> | Sumpfmeise | <i>Poecile palustris</i> |
| Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus ochrurus</i> | Sumpfrohrsänger | <i>Acrocephalus palustris</i> |
| Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | Tannenmeise | <i>Parus ater</i> |
| Hohлтаube | <i>Columba oenas</i> | Teichralle / Teichhuhn | <i>Gallinula chloropus*</i> |
| Kleinspecht | <i>Dendrocopos minor</i> | Teichrohrsänger | <i>Acrocephalus scirpaceus*</i> |
| Kernbeisser | <i>Coccothraustes</i> | Trauerschnäpper | <i>Ficedula hypoleuca</i> |
| Klappergrasmücke | <i>Sylvia curruca</i> | Türkentaube | <i>Streptopelia decaocto</i> |
| Kleiber | <i>Sitta europaea</i> | Wintergoldhähnchen | <i>Regulus regulus</i> |
| Kohlmeise | <i>Parus major*</i> | Zaunkönig | <i>Troglodytes troglodytes</i> |
| Kolkrabe | <i>Corvus corax</i> | Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita*</i> |
| Kormoran | <i>Phalacrocorax capo</i> | | |

* haben mindestens einmal im Biotop gebrütet, viele Arten nur vorbeifliegend aber häufig vom Biotop angeht; Unterstrichen sind nicht unbedingt alltägliche Arten, die mindestens einmal gesichtet werden konnten, für die das Biotop aber eine besondere Bedeutung hat.



Buntspecht (*Dendrocopos maj*)

©Fritz Liechti



Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

©Fritz Liechti

Am Biotop beobachtete Vogelarten der Roten Liste der Schweiz - Viele Arten nur vorbeifliegend aber häufig vom Biotop angelockt, ohne dass sie sich niedergelassen haben.

| Deutscher Name | Wissenschaftl. Name | Rote Liste Kategorie | Deutscher Name | Wissenschaftl. Name | Rote Liste Kategorie |
|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Alpensegler | Tachymarptis melba | NT | Ortolan | Emberiza hortulana | CR |
| Baumfalke | Falco subbuteo | NT | Reiherente | Aythya fuligula | VU |
| Beutelmeise | Remiz pendulinus | VU | Rohrhammer | Emberiza schoeniclus | VU |
| Braunkehlchen | Saxicola ruberta | VU | Ringdrossel | Turdus torquatus | VU |
| Dohle | Corvus monedula | VU | Rohrschwirl | Locustella luscinioides | NT |
| Dorngrasmücke | Sylvia communis | NT | Schafstelze | Motacilla flava | NT |
| Dunkellaubsänger | Phylloscopus fuscatus** | EN | Schnatterente | Anas strepera | EN |
| Eisvogel | Alcedo atthis | VU | Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus | VU |
| Feldlerche | Alauda arvensis | NT | Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola | NT |
| Feldschwirl | Locustella naevia | NT | Schwarzkopfmöwe | Larus melanocephalus | VU |
| Fitis | Phylloscopus trochilus | VU | Sturmmöwe | Larus canus | EN |
| Flussuferläufer | Actitis hypoleucos | EN | Tafelente | Aythya ferina | EN |
| Gartengrasmücke | Sylvia borin | NT | Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana | VU |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | NT | Turmfalke | Falco tinnunculus | NT |
| Gelbspötter | Hippolais icterina | VU | Uferschwalbe | Riparia riparia | VU |
| Grauspecht | Picus canus | VU | Wacholderdrossel | Turdus pilaris | VU |
| Hänfling | Carduelis cannabina | NT | Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix | VU |
| Haubenlerche | Parus cristatus | RE | Waldschnepfe | Scolopax rusticola | VU |
| Heidenlerche | Lullula arborera | VU | Wanderfalke | Falco peregrinus | NT |
| Kiebitz | Vanellus vanellus | CR | Weisssterniges Blaukehlchen | Luscinia svecica cyanecuals*** | VU |
| Kolbenente | Netta rufina | NT | Weisstorch | Ciconia ciconia | VU |
| Lachmöwe | Larus ridibundus | EN | Wendehals | Jynx torquilla | NT |
| Mauersegler | Apus apus | NT | Wespenbussard | Pernis apivorus | NT |
| Mehlschwalbe | Delichon urbicum | NT | Wiesenpieper | Anthus pratensis | VU |
| Mittelspecht | Dendrocopios medius | NT | Wiedehopf | Upupa epops | VU |
| Orpheusspötter | Hipolais polyglotta | NT | | | |

** Erstbeobachtung und bisher einzige in der Schweiz im „Biotop am Stausee“ von 19. – 22. Oktober 1992 !!! *** Erstbeobachtung am 1. April 2013. **Rote Liste der Schweizer Brutvögel, Stand 2010: RE:** in CH ausgestorben, **CR:** vom Aussterben bedroht **EN:** Stark gefährdet, **VU:** Verletzlich, **NT:** Potentiell gefährdet. **39% der in der Schweiz brütenden Vögel stehen auf der Roten Liste. Besonders gefährdet sind diejenigen, welche in Feuchtgebieten oder im Kulturland vorkommen.**



Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

© F.Liechti



Weissterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyanecula*)

© F.Liechti

****Höhepunkt der rund letzten 30 Jahre:**

Der absolute Höhepunkt war der viertägige Besuch eines **Dunkel Laubsängers (Phylloscopus fuscatus)** vom 19. – 22. Oktober 1992. Es ist dies die **erste und bis jetzt einzige Beobachtung** dieser ostasiatischen Art in der Schweiz! Aus der ganzen Schweiz kamen Ornithologen zum kleinen Biotop in Birsfelden, um diesen seltenen Irrgast zu bewundern!



Dunkellaubsänger (*Phylloscopus fuscatus*)

© ornitho.ch

Der Dunkle (oder Braune) Laubsänger brütet in den Gebieten vom Himalaya bis Nordostsibirien und überwintert normalerweise in Südostasien. Doch es kommt immer wieder vor, dass sich alljährlich einige Exemplare nach Nordeuropa, seltener nach Mittel- oder Südeuropa (bisher je ein Nachweis in Österreich und Norditalien) verfliegen.

Nach Einschätzung der Ornithologen muss dieser 10 bis 15 Gramm schwere Vogel sicher 5000 km geflogen sein, um zu uns zu gelangen!

Dieser wunderbare Nachweis zeigt, dass schon ein kleines Naturschutzgebiet, wie das „Biotop Am Stausee“ im unmittelbaren Siedlungsraum Birsfelden, wichtig sein kann für die Artenförderung unserer Vogelwelt!

Das nun schon 30-jährige Biotop erfüllt also eine wichtige Funktion für die Vogelwelt als Brut- oder Rastplatz.

Brutvögel (z.T. unregelmässig):

Im Folgenden drei herausragende Brutereignisse des „Biotop am Stausee“, Birsfelden, die aus dem Brutvogel-Inventar der beiden Basler Kantone der 1990er Jahre zu entnehmen sind:

- **Klappergrasmücke** (*Sylvia curruca*): wahrscheinlicher Brutvogel.
- **Rohrammer** (*Emberiza schoeniclus*): erste erfolgreiche Brut beider Basel 1994!
- **Teichrohrsänger** (*Acrocephalus scirpaceus*): wahrscheinlicher Brutvogel, da 4 Juv. am 24. Juni 1989 gesichtet worden sind.

Im Brutvogelinventar wird der Teichrohrsänger nur 8 Mal als wahrscheinlicher oder sicherer Brutvogel in den Kantonen BS und BL erwähnt, bei der Klappergrasmücke sind es insgesamt sogar nur 3 Nennungen als sicherer Brutvogel!

Am Teich: Seit 9 Jahren Brutversuch des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*). Stockente

Sonstige Bruterfolge im Biotop von: Amseln, Kohl- u. Blaumeise, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp etc..



Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

© ornitho.ch



Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

© F.Liechti



Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

© F.Liechti



Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

© F.Liechti

Die Artenlisten wurden zusammengestellt im Mai 2013 durch Judith Roth – NVVB Vorstand (Inhalt ohne Gewähr).